

Họ, tên thí sinh:
Số báo danh:

Mã đề thi 205

Câu 81: Số lượng cây tràm ở rừng U Minh Thượng giảm mạnh sau sự cố cháy rừng bất thường vào tháng 3 năm 2002 là dạng biến động

- A. theo chu kỳ nhiều năm. B. theo chu kỳ mùa.
C. không theo chu kỳ. D. theo chu kỳ ngày đêm.

Câu 82: Ở ruồi giấm, alen A quy định thân xám là trội hoàn toàn so với alen a quy định thân đen; alen B quy định cánh dài là trội hoàn toàn so với alen b quy định cánh cụt. Kiểu gen nào sau đây quy định kiểu hình thân đen, cánh dài?

- A. $\frac{aB}{aB}$ B. $\frac{Ab}{Ab}$ C. $\frac{AB}{AB}$ D. $\frac{ab}{ab}$

Câu 83: Giao phối không ngẫu nhiên làm thay đổi thành phần kiểu gen của quần thể theo hướng

- A. luôn giảm tần số kiểu gen đồng hợp tử trội.
B. luôn tăng tần số kiểu gen dị hợp tử, giảm tần số kiểu gen đồng hợp tử.
C. luôn giảm tần số kiểu gen đồng hợp tử lặn.
D. giảm tần số kiểu gen dị hợp tử, tăng tần số kiểu gen đồng hợp tử.

Câu 84: Trong kỹ thuật chuyển gen có bước nào sau đây?

- A. Tạo dòng thuần chủng. B. Tạo ADN tái tổ hợp.
C. Xử lý mẫu vật bằng tác nhân đột biến. D. Lai các dòng thuần chủng khác nhau.

Câu 85: Ở một quần thể đậu Hà Lan, xét một gen có hai alen (A và a), tần số alen a là 0,3. Theo lý thuyết, tần số alen A của quần thể này là

- A. 0,09. B. 0,7. C. 0,3. D. 0,49.

Câu 86: Quá trình giảm phân bình thường của cơ thể có kiểu gen $X^A Y$ tạo ra tối đa bao nhiêu loại giao tử?

- A. 2. B. 4. C. 1. D. 3.

Câu 87: Ở người, cơ quan nào sau đây thuộc hệ hô hấp?

- A. Ruột. B. Thận. C. Tim. D. Phổi.

Câu 88: Quần xã sinh vật có đặc trưng nào sau đây?

- A. Mật độ. B. Thành phần loài. C. Tỷ lệ giới tính. D. Nhóm tuổi.

Câu 89: Trong hệ sinh thái rừng ngập mặn, nhân tố sinh thái nào sau đây là nhân tố hữu sinh?

- A. Khí O_2 . B. Độ mặn của nước. C. Cây đước. D. Ánh sáng.

Câu 90: Ở vi khuẩn, mạch làm khuôn của một đoạn gen có trình tự nuclêôtit: 3'...TTAAGXGXA...5'. Đoạn phân tử mRNA được phiên mã từ đoạn gen này có trình tự nuclêôtit là

- A. 5'...AATTXGXGT...3'. B. 5'...AAUUXGXGU...3'.
C. 5'...UXGGXUUA...3'. D. 5'...TTAAGXGXA...3'.

Câu 91: Dấu vết của lá dương xỉ trên than đá được phát hiện có từ đại Cổ sinh thuộc bằng chứng tiến hóa nào sau đây?

- A. Tế bào học. B. Sinh học phân tử. C. Cơ quan thoái hóa. D. Hóa thạch.

Câu 92: Bộ ba nào sau đây là bộ ba kết thúc?

- A. 5'UAX3'. B. 5'UXG3'. C. 5'UAG3'. D. 5'UAU3'.

Câu 93: Trong quy trình tạo giống bằng phương pháp gây đột biến, bước cuối cùng là

- A. tạo dòng thuần chủng từ thể đột biến có kiểu hình mong muốn.
B. chọn lọc các thể đột biến có kiểu hình mong muốn.
C. xử lý mẫu vật bằng tác nhân đột biến.
D. thu thập vật liệu và lựa chọn tác nhân gây đột biến.

Câu 94: Tác nhân gây đột biến nào sau đây là tác nhân vật lý?

- A. 5 - brom uraxin. B. Tia tử ngoại. C. Virut. D. Cónsixin.

Câu 95: Sự phân li độc lập của các cặp NST tương đồng trong giảm phân dẫn đến sự phân li độc lập của các cặp alen về các giao tử là cơ sở tế bào học của quy luật

- A. liên kết với giới tính. B. hoán vị gen. C. liên kết gen. D. phân li độc lập.

Câu 96: Ở cây đậu thơm, kiểu gen có đồng thời hai loại alen trội A và B nằm trên hai NST khác nhau quy định kiểu hình hoa đỏ, khi chỉ có một trong hai loại alen trội hoặc không có alen trội nào thì quy định kiểu hình hoa trắng. Kiểu gen nào sau đây quy định kiểu hình hoa đỏ?

- A. AAbb. B. aaBB. C. AaBb. D. aabb.

Câu 97: Ở một loài thực vật, sự kết hợp giữa giao tử $2n$ và giao tử n tạo thành hợp tử có bộ NST

- A. $3n$. B. $2n$. C. $4n$. D. n .

Câu 98: Những loài có quan hệ họ hàng càng gần thì trình tự các axit amin của cùng một loại prôtêin có xu hướng càng giống nhau. Đây là bằng chứng

- A. giải phẫu so sánh. B. tế bào học. C. hóa thạch. D. sinh học phân tử.

Câu 99: Hệ sinh thái nào sau đây thuộc nhóm hệ sinh thái dưới nước?

- A. Hồ nước ngọt. B. Thảo nguyên. C. Đồng rêu hàn đới. D. Rừng lá kim phương Bắc.

Câu 100: Dạng đột biến nào sau đây không phải là đột biến cấu trúc NST?

- A. Đảo đoạn. B. Lệch bội. C. Lặp đoạn. D. Mất đoạn.

Câu 101: Bộ rừng sống thành đàn hỗ trợ nhau tìm kiếm thức ăn giúp tăng khả năng sống sót của các cá thể trong đàn. Đây là ví dụ về mối quan hệ sinh thái

- A. kí sinh. B. hỗ trợ cùng loài. C. cạnh tranh cùng loài. D. ức chế - cảm nhiễm.

Câu 102: Phát biểu nào sau đây về vai trò của quang hợp ở thực vật là đúng?

- A. Quang hợp cung cấp chất hữu cơ cho các sinh vật dị dưỡng.
B. Giải phóng năng lượng chủ yếu dưới dạng nhiệt năng.
C. Quang hợp điều hòa không khí thông qua giải phóng CO_2 .
D. Chuyển hóa nhiệt năng thành quang năng trong các liên kết hóa học.

Câu 103: Bào quan nào sau đây không tham gia vào quá trình hô hấp sáng ở thực vật?

- A. Ti thể. B. Peroxisôm. C. Lục lạp. D. Ribôxôm.

Câu 104: Phát biểu nào sau đây về tuần hoàn máu của người bình thường là đúng?

- A. Tim co dẫn tự động theo chu kì. B. Vận tốc máu lớn nhất ở mao mạch.
C. Tim hoạt động không có tính chu kì. D. Huyết áp cao nhất ở tĩnh mạch.

Câu 105: Phát biểu nào sau đây về đột biến gen là đúng?

- A. Đột biến gen không phải là nguyên liệu cho quá trình tiến hóa.
B. Các dạng đột biến điểm gồm: thay thế, thêm, mất một cặp nucleôtit.
C. Mức độ gây hại của alen đột biến chỉ phụ thuộc vào điều kiện môi trường.
D. Đột biến gen luôn làm biến đổi cấu trúc của prôtêin.

Câu 106: Lúa mì hoang dại (*Aegilops squarrosa*) có bộ NST $2n = 14$. Số NST trong giao tử ($n + 1$) của loài này là

- A. 7. B. 13. C. 8. D. 6.

Câu 107: Để bảo tồn đa dạng sinh học, tránh nguy cơ tuyệt chủng nhiều loài động vật quý hiếm, cần ngăn chặn hành động nào sau đây?

- A. Bảo vệ các khu rừng tự nhiên. B. Trồng cây gây rừng.
C. Xây dựng các khu bảo tồn thiên nhiên. D. Săn bắt các loài động vật hoang dã.

Câu 108: Theo lí thuyết, phép lai nào sau đây cho đời con có tỉ lệ kiểu gen là 1 : 1?

- A. $aaBb \times AaBB$. B. $Aabb \times AaBb$. C. $Aabb \times aabb$. D. $AaBb \times aabb$.

Câu 109: Phát biểu nào sau đây về các đặc trưng cơ bản của quần thể sinh vật là đúng?

- A. Kích thước của quần thể chỉ phụ thuộc vào mức độ sinh sản.
B. Cấu trúc tuổi của các quần thể luôn giống nhau.
C. Mật độ của quần thể phụ thuộc vào điều kiện của môi trường sống.
D. Tỉ lệ giới tính của các quần thể luôn là 2 : 1.

Câu 110: Thực chất của chọn lọc tự nhiên theo thuyết tiến hóa tổng hợp hiện đại là

- A. hình thành các quần thể có nhiều cá thể mang các đặc điểm kém thích nghi với môi trường.
B. phân hoá khả năng sống sót và sinh sản của các cá thể với các kiểu gen khác nhau trong quần thể.
C. tạo nên loài sinh vật có các đặc điểm kém thích nghi với môi trường.
D. không làm thay đổi cấu trúc di truyền của quần thể qua các thế hệ.

Câu 111: Ở ruồi giấm, xét kiểu gen $\frac{AB}{ab}$, trong đó alen A quy định thân xám là trội hoàn toàn so với alen a quy định thân đen; alen B quy định cánh dài là trội hoàn toàn so với alen b quy định cánh cụt. Có bao nhiêu phát biểu sau đây về hai gen này là đúng?

- Một tế bào sinh tinh giấm phân bình thường tạo ra tối đa hai loại tinh trùng.
- Nếu một tế bào sinh trứng xảy ra sự không phân li của cặp NST mang hai gen này trong giảm phân I, giảm phân II bình thường thì không thể tạo ra loại trứng có kiểu gen ΔB .
- Một tế bào sinh trứng giấm phân bình thường tạo ra bốn loại trứng.
- Cơ thể đực giấm phân bình thường tạo ra tối đa bốn loại tinh trùng.

A. 4. B. 3. C. 1. D. 2.

Câu 112: Ở một loài thực vật, tính trạng màu hoa do ba gen không alen phân li độc lập quy định tương tác theo kiểu bổ sung, mỗi gen có hai alen. Tiến hành các phép lai, kết quả thu được kiểu hình của đời con thể hiện ở bảng dưới đây:

Phép lai	Tổ hợp lai	Tỉ lệ kiểu hình ở đời con
1	P: Cây hoa trắng (a) × Cây hoa trắng (c)	F ₁ : 100% hoa trắng
2	P: Cây hoa trắng (b) × Cây hoa trắng (c)	F ₁ : 100% hoa trắng
3	P: Cây hoa trắng (a) × Cây hoa trắng (b)	F ₁ : 100% hoa đỏ
4	F ₁ của phép lai 3 × F ₁ của phép lai 1	F ₂ : 3 hoa đỏ : 13 hoa trắng
5	F ₁ của phép lai 3 × F ₁ của phép lai 2	F ₂ : 9 hoa đỏ : 23 hoa trắng

Biết rằng các cây hoa trắng (a), (b), (c) đều thuần chủng. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây về tính trạng này là đúng?

- Nếu cho cây F₁ của phép lai 3 lai với cây hoa trắng (c) thì đời con có tỉ lệ kiểu hình là 1 hoa đỏ : 7 hoa trắng.
- Nếu cho cây F₁ của phép lai 2 giao phấn ngẫu nhiên thì đời con có tỉ lệ kiểu hình là 100% hoa trắng.
- Nếu cho cây F₁ của phép lai 3 tự thụ phấn thì đời con có tỉ lệ kiểu hình là 27 hoa đỏ : 37 hoa trắng.
- Nếu cho cây F₁ của phép lai 1 tự thụ phấn thì đời con có tỉ lệ kiểu hình là 100% hoa trắng.

A. 2. B. 1. C. 3. D. 4.

Câu 113: Để nghiên cứu ảnh hưởng của chặt phá rừng đến sự thất thoát lượng khoáng trong đất, người ta chọn hai lô trong một khu rừng với điều kiện ban đầu như nhau.

Lô A: Không có chặt phá rừng và không sử dụng thuốc diệt cỏ trong thời gian nghiên cứu.

Lô B: Trải qua ba giai đoạn, giai đoạn I (rừng chưa bị chặt phá), giai đoạn II (rừng bị chặt hoàn toàn và sử dụng thuốc diệt cỏ để ngăn chặn sự phát triển của thảm thực vật nhưng không tiêu diệt hết động vật), giai đoạn III (thuốc diệt cỏ không còn được sử dụng nên thảm thực vật bắt đầu phát triển tự nhiên).

Kết quả nghiên cứu được thể hiện ở bảng dưới đây:


Giai đoạn		I			II			III			
Năm thứ		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Sinh khối thực vật (g/m ²)	Lô A	780	782	780	779	778	780	782	781	780	779
	Lô B	779	781	780	0	0	0	50	120	250	400
Lượng khoáng thất thoát hằng năm (kg/ha)	Lô A	13	9	13	13	14	13	12	13	12	13
	Lô B	14	10	13	65	72	76	55	35	20	18

Có bao nhiêu phát biểu sau đây về nghiên cứu này là đúng?

- Ở lô B, giai đoạn I có sinh khối thực vật lớn nhất và lượng khoáng thất thoát hằng năm là nhỏ nhất.
- Ở lô B, giai đoạn II có lượng khoáng thất thoát hằng năm tăng làm lượng khoáng trong đất giảm dần.
- Ở lô B, giai đoạn III xảy ra diễn thế nguyên sinh với sinh khối thực vật tăng dần.
- Nghiên cứu này cho thấy phục hồi rừng có thể làm giảm sự thất thoát lượng khoáng trong đất.

A. 2. B. 4. C. 3. D. 1.

Câu 114: Hình bên mô tả sự biến đổi tần số alen a ở ba quần thể (1), (2), (3) của một loài chuột đang chịu tác động của yếu tố ngẫu nhiên qua các thế hệ. Trong đó, alen A quy định màu lông đen có ưu thế thích nghi hơn và trội hoàn toàn so với alen a quy định màu lông trắng. Biết kích thước ban đầu của các quần thể (1), (2), (3) lần lượt là 20, 1000, 20 cá thể. Có bao nhiêu phát biểu sau đây về ba quần thể này là đúng?



- I. Tần số alen a của quần thể (3) biến động ít hơn so với quần thể (2).
- II. Yếu tố ngẫu nhiên có thể đảo thái hoàn toàn alen trội có lợi ra khỏi quần thể.
- III. Ở thế hệ 50, quần thể (3) chỉ toàn các cá thể có kiểu gen aa.
- IV. Ở thế hệ 35, quần thể (1) chỉ toàn các cá thể có kiểu hình lông trắng.


A. 3.

B. 4.

C. 2.

D. 1.

Câu 115: Hình bên mô tả mối quan hệ về độ cao mỏ khác nhau giữa các nhóm cá thể của hai loài chim sẻ ăn hạt *G. fuliginosa* và *G. fortis* thuộc quần đảo Galapagos qua thời gian dài trong hai trường hợp: khi sống chung trên một đảo (Hình A), khi sống riêng trên hai đảo (Hình B, C). Biết rằng, độ cao mỏ chim có mối tương quan thuận với kích thước hạt. Theo lý thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây về hai loài này là đúng?



Hình A

Hình B

Hình C

- I. Khi sống riêng, trong mỗi loài, độ cao mỏ càng lớn thì tỉ lệ % các cá thể của nhóm đó càng lớn.
- II. Khi sống chung, loài *G. fuliginosa* thích nghi với ăn hạt to, loài *G. fortis* thích nghi với ăn hạt nhỏ.
- III. Khi sống chung, sự cạnh tranh về thức ăn là nguyên nhân chính gây ra sự phân hóa về độ cao mỏ giữa hai loài.
- IV. Khi sống riêng, loài *G. fortis* có sự đa dạng về độ cao mỏ hơn so với loài *G. fuliginosa*.

A. 4.

B. 1.

C. 2.

D. 3.

Câu 116: Ở người, alen A quy định có kháng nguyên Xg trên bề mặt hồng cầu là trội hoàn toàn so với alen a quy định không có kháng nguyên Xg; alen B quy định da bình thường là trội hoàn toàn so với alen b quy định bệnh da vảy. Hai gen này cùng nằm trên vùng không tương đồng của NST giới tính X và cách nhau 10 cM. Một người phụ nữ (H) có kháng nguyên Xg và da bình thường lấy một người đàn ông không có kháng nguyên Xg và da vảy sinh ra một người con gái (M) có kháng nguyên Xg và da bình thường. (M) kết hôn với người chồng (N) không có kháng nguyên Xg và da bình thường. Theo lý thuyết, những phát biểu nào sau đây về hai tình trạng này là đúng?

- I. Kiểu gen của người (H) và người (M) chắc chắn khác nhau.
- II. Cặp vợ chồng (M) - (N) có thể sinh con trai có kháng nguyên Xg và bệnh da vảy.
- III. Người con gái (M) có thể tạo ra loại giao tử X^{aB} chiếm tỉ lệ 10%.
- IV. Trong quần thể có tối đa 14 loại kiểu gen về hai tính trạng này.

A. II và III.

B. I và III.

C. III và IV.

D. II và IV.

