

**BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO**  
**ĐỀ THI CHÍNH THỨC**  
(Đề thi có 06 trang)

**KỶ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2023**

Bài thi: **KHOA HỌC TỰ NHIÊN**  
Môn thi thành phần: **SINH HỌC**

Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề

Họ, tên thí sinh

Số báo danh:

Mã đề thi 221

- Câu 81:** Trong hệ sinh thái rừng ngập mặn, nhân tố sinh thái nào sau đây là nhân tố hữu sinh?  
A. Khí O<sub>2</sub>. B. Độ mặn của nước. C. Cây đước. D. Ánh sáng.
- Câu 82:** Những loài có quan hệ họ hàng càng gần thì trình tự các axit amin của cùng một loại prôtêin có xu hướng càng giống nhau. Đây là bằng chứng  
A. sinh học phân tử. B. hóa thạch. C. tế bào học. D. giải phẫu so sánh.
- Câu 83:** Tác nhân gây đột biến nào sau đây là tác nhân vật lí?  
A. 5 - brom uraxin. B. Tia tử ngoại. C. Virut. D. Cônixin.
- Câu 84:** Bò rừng sống thành đàn hỗ trợ nhau tìm kiếm thức ăn giúp tăng khả năng sống sót của các cá thể trong đàn. Đây là ví dụ về mối quan hệ sinh thái  
A. cạnh tranh cùng loài. B. kí sinh. C. ức chế - cảm nhiễm. D. hỗ trợ cùng loài.
- Câu 85:** Quá trình giảm phân bình thường của cơ thể có kiểu gen X<sup>A</sup>Y tạo ra tối đa bao nhiêu loại giao tử?  
A. 3. B. 2. C. 1. D. 4.
- Câu 86:** Ở cây đậu thơm, kiểu gen có đồng thời hai loại alen trội A và B nằm trên hai NST khác nhau quy định kiểu hình hoa đỏ, khi chỉ có một trong hai loại alen trội hoặc không có alen trội nào thì quy định kiểu hình hoa trắng. Kiểu gen nào sau đây quy định kiểu hình hoa đỏ?  
A. aaBB. B. AAbb. C. AaBB. D. aabb.
- Câu 87:** Ở người, cơ quan nào sau đây thuộc hệ hô hấp?  
A. Ruột. B. Phổi. C. Thận. D. Tim.
- Câu 88:** Ở một quần thể đậu Hà Lan, xét một gen có hai alen (A và a), tần số alen a là 0,3. Theo lí thuyết, tần số alen A của quần thể này là  
A. 0,7. B. 0,3. C. 0,49. D. 0,09.
- Câu 89:** Hệ sinh thái nào sau đây thuộc nhóm hệ sinh thái dưới nước?  
A. Đồng rêu hàn đới. B. Thảo nguyên. C. Rừng lá kim phương Bắc. D. Hồ nước ngọt.
- Câu 90:** Trong quy trình tạo giống bằng phương pháp gây đột biến, bước cuối cùng là  
A. chọn lọc các thể đột biến có kiểu hình mong muốn.  
B. tạo dòng thuần chủng từ thể đột biến có kiểu hình mong muốn.  
C. thu thập vật liệu và lựa chọn tác nhân gây đột biến.  
D. xử lí mẫu vật bằng tác nhân đột biến.
- Câu 91:** Quần xã sinh vật có đặc trưng nào sau đây?  
A. Mật độ. B. Tỷ lệ giới tính. C. Thành phần loài. D. Nhóm tuổi.
- Câu 92:** Ở một loài thực vật, sự kết hợp giữa giao tử 2n và giao tử n tạo thành hợp tử có bộ NST  
A. n. B. 4n. C. 2n. D. 3n.
- Câu 93:** Dạng đột biến nào sau đây không phải là đột biến cấu trúc NST?  
A. Lệch bội. B. Mất đoạn. C. Lặp đoạn. D. Đảo đoạn.
- Câu 94:** Ở vi khuẩn, mạch làm khuôn của một đoạn gen có trình tự nuclêôtit: 3'...TTAAGXGXA...5'. Đoạn phân tử mARN được phiên mã từ đoạn gen này có trình tự nuclêôtit là  
A. 5'...TTAAGXGXA...3'. B. 5'...AAUUXGXGU...3'.  
C. 5'...AATTXGXGT...3'. D. 5'...UXGGXUUA...3'.
- Câu 95:** Số lượng cây trám ở rừng U Minh Thượng giảm mạnh sau sự cố cháy rừng bất thường vào tháng 3 năm 2002 là dạng biến động  
A. theo chu kì ngày đêm. B. theo chu kì nhiều năm.  
C. không theo chu kì. D. theo chu kì mùa.

Câu 96: Trong kĩ thuật chuyển gen có bước nào sau đây?

- A. Lai các dòng thuần chủng khác nhau.  
B. Tạo dòng thuần chủng.  
C. Tạo ADN tái tổ hợp.  
D. Xử lí mẫu vật bằng tác nhân đột biến.

Câu 97: Sự phân li độc lập của các cặp NST tương đồng trong giảm phân dẫn đến sự phân li độc lập của các cặp alen về các giao tử là cơ sở tế bào học của quy luật

- A. liên kết với giới tính. B. hoán vị gen.  
C. phân li độc lập.  
D. liên kết gen.

Câu 98: Giao phối không ngẫu nhiên làm thay đổi thành phần kiểu gen của quần thể theo hướng

- A. luôn giảm tần số kiểu gen đồng hợp tử lặn.  
B. luôn giảm tần số kiểu gen đồng hợp tử trội.  
C. luôn tăng tần số kiểu gen dị hợp tử, giảm tần số kiểu gen đồng hợp tử.  
D. giảm tần số kiểu gen dị hợp tử, tăng tần số kiểu gen đồng hợp tử.

Câu 99: Bộ ba nào sau đây là bộ ba kết thúc?

- A. 5'UAU3'. B. 5'UXG3'. C. 5'UAG3'. D. 5'UAX3'.

Câu 100: Ở ruồi giấm, alen A quy định thân xám là trội hoàn toàn so với alen a quy định thân đen; alen B quy định cánh dài là trội hoàn toàn so với alen b quy định cánh cụt. Kiểu gen nào sau đây quy định kiểu hình thân đen, cánh dài?

- A.  $\frac{AB}{AB} \frac{a}{a}$  B.  $\frac{ab}{ab}$  C.  $\frac{Ab}{Ab}$  D.  $\frac{aB}{aB}$

Câu 101: Dấu vết của lá dương xỉ trên than đá được phát hiện có từ đại Cổ sinh thuộc bằng chứng tiến hóa nào sau đây?

- A. Tế bào học. B. Hóa thạch. C. Sinh học phân tử. D. Cơ quan thoái hóa.

Câu 102: Thực chất của chọn lọc tự nhiên theo thuyết tiến hóa tổng hợp hiện đại là

- A. tạo nên loài sinh vật có các đặc điểm kém thích nghi với môi trường.  
B. hình thành các quần thể có nhiều cá thể mang các đặc điểm kém thích nghi với môi trường.  
C. không làm thay đổi cấu trúc di truyền của quần thể qua các thế hệ.  
D. phân hoá khả năng sống sót và sinh sản của các cá thể với các kiểu gen khác nhau trong quần thể.

Câu 103: Phát biểu nào sau đây về tuần hoàn máu của người bình thường là đúng?

- A. Huyết áp cao nhất ở tĩnh mạch. B. Vận tốc máu lớn nhất ở mao mạch.  
C. Tim hoạt động không có tính chu kì. D. Tim co dãn tự động theo chu kì.

Câu 104: Theo lí thuyết, phép lai nào sau đây cho đời con có tỉ lệ kiểu gen là 1 : 1?

- A. Aabb × aabb. B. aaBb × AaBB. C. AaBb × aabb. D. Aabb × AaBb.

Câu 105: Phát biểu nào sau đây về đột biến gen là đúng?

- A. Đột biến gen không phải là nguyên liệu cho quá trình tiến hóa.  
B. Đột biến gen luôn làm biến đổi cấu trúc của prôtêin.  
C. Các dạng đột biến điểm gồm: thay thế, thêm, mất một cặp nuclêôtit.  
D. Mức độ gây hại của alen đột biến chỉ phụ thuộc vào điều kiện môi trường.

Câu 106: Bào quan nào sau đây không tham gia vào quá trình hô hấp sáng ở thực vật?

- A. Lục lạp. B. Ribôxôm. C. Peroxisôm. D. Ti thể.

Câu 107: Phát biểu nào sau đây về các đặc trưng cơ bản của quần thể sinh vật là đúng?

- A. Tỉ lệ giới tính của các quần thể luôn là 2 : 1.  
B. Mật độ của quần thể phụ thuộc vào điều kiện của môi trường sống.  
C. Cấu trúc tuổi của các quần thể luôn giống nhau.  
D. Kích thước của quần thể chỉ phụ thuộc vào mức độ sinh sản.

Câu 108: Lúa mi hoang dại (*Aegilops squarrosa*) có bộ NST  $2n = 14$ . Số NST trong giao tử ( $n + 1$ ) của loài này là


- A. 13. B. 7. C. 6. D. 8.

Câu 109: Để bảo tồn đa dạng sinh học, tránh nguy cơ tuyệt chủng nhiều loài động vật quý hiếm, cần ngăn chặn hành động nào sau đây?

- A. Săn bắt các loài động vật hoang dã.  
B. Xây dựng các khu bảo tồn thiên nhiên.  
C. Trồng cây gây rừng.  
D. Bảo vệ các khu rừng tự nhiên.



**Câu 114:** Hình bên mô tả mối quan hệ về độ cao mỏ khác nhau giữa các nhóm cá thể của hai loài chim sẻ ăn hạt *G. fuliginosa* và *G. fortis* thuộc quần đảo Galapagos qua thời gian dài trong hai trường hợp: khi sống chung trên một đảo (Hình A), khi sống riêng trên hai đảo (Hình B, C). Biết rằng, độ cao mỏ chim có mối tương quan thuận với kích thước hạt. Theo lý thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây về hai loài này là đúng?



- I. Khi sống riêng, trong mỗi loài, độ cao mỏ càng lớn thì tỉ lệ % các cá thể của nhóm đó càng lớn.
- II. Khi sống chung, loài *G. fuliginosa* thích nghi với ăn hạt to, loài *G. fortis* thích nghi với ăn hạt nhỏ.
- III. Khi sống chung, sự cạnh tranh về thức ăn là nguyên nhân chính gây ra sự phân hóa về độ cao mỏ giữa hai loài.
- IV. Khi sống riêng, loài *G. fortis* có sự đa dạng về độ cao mỏ hơn so với loài *G. fuliginosa*.


A. 4.                      B. 3.                      C. 2.                      **D. 1.**

**Câu 115:** Ở người, alen A quy định có kháng nguyên Xg trên bề mặt hồng cầu là trội hoàn toàn so với alen a quy định không có kháng nguyên Xg; alen B quy định da bình thường là trội hoàn toàn so với alen b quy định bệnh da vảy. Hai gen này cùng nằm trên vùng không tương đồng của NST giới tính X và cách nhau 10 cM. Một người phụ nữ (H) có kháng nguyên Xg và da bình thường lấy một người đàn ông không có kháng nguyên Xg và da vảy sinh ra một người con gái (M) có kháng nguyên Xg và da bình thường. (M) kết hôn với người chồng (N) không có kháng nguyên Xg và da bình thường. Theo lý thuyết, những phát biểu nào sau đây về hai tính trạng này là đúng?

- I. Kiểu gen của người (H) và người (M) chắc chắn khác nhau.
- II. Cặp vợ chồng (M) - (N) có thể sinh con trai có kháng nguyên Xg và bệnh da vảy.
- III. Người con gái (M) có thể tạo ra loại giao tử  $X^{aB}$  chiếm tỉ lệ 10%.
- IV. Trong quần thể có tối đa 14 loại kiểu gen về hai tính trạng này.

**A.** II và IV.                      B. I và III.                      C. II và III.                      **D.** III và IV.

**Câu 116:** Hình bên mô tả một giai đoạn của quá trình phiên mã xảy ra trong vùng mã hóa của một gen ở sinh vật nhân sơ. Các kí hiệu (a), (b), (c), (d), (f), (g) là các vị trí tương ứng



với đầu 3' hoặc 5' của mạch pôlinuclêôtit; vị trí nuclêôtit 1-2-3 là bộ ba mở đầu; nuclêôtit chưa xác định [?] liên kết với nuclêôtit [G] của mạch khuôn trong quá trình phiên mã, các nuclêôtit còn lại của gen không được thể hiện trên hình. Có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

- I. Vị trí (d) tương ứng với đầu 5' của mạch làm khuôn.
- II. Nếu nuclêôtit [?] trên hình là U thì sẽ phát sinh đột biến gen.
- III. Nếu nuclêôtit [?] trên hình là U thì phân tử mARN này khi làm khuôn để dịch mã sẽ tạo ra chuỗi pôlipeptit có 6 axit amin (không kể axit amin mở đầu).
- IV. Quá trình phiên mã của gen này chỉ diễn ra trên một mạch.

A. 3.                      B. 2.                      **C.** 1.                      D. 4.



**Câu 120:** Để nghiên cứu ảnh hưởng của chặt phá rừng đến sự thất thoát lượng khoáng trong đất, người ta chọn hai lô trong một khu rừng với điều kiện ban đầu như nhau.

Lô A: Không có chặt phá rừng và không sử dụng thuốc diệt cỏ trong thời gian nghiên cứu.

Lô B: Trải qua ba giai đoạn, giai đoạn I (rừng chưa bị chặt phá), giai đoạn II (rừng bị chặt hoàn toàn và sử dụng thuốc diệt cỏ để ngăn chặn sự phát triển của thảm thực vật nhưng không tiêu diệt hết động vật), giai đoạn III (thuốc diệt cỏ không còn được sử dụng nên thảm thực vật bắt đầu phát triển tự nhiên).

Kết quả nghiên cứu được thể hiện ở bảng dưới đây:

Giai đoạn		I			II			III			
Năm thứ		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Sinh khối thực vật (g/m <sup>2</sup> )	Lô A	780	782	780	779	778	780	782	781	780	779
	Lô B	779	781	780	0	0	0	50	120	250	400
Lượng khoáng thất thoát hàng năm (kg/ha)	Lô A	13	9	13	13	14	13	12	13	12	13
	Lô B	14	10	13	65	72	76	55	35	20	18

Có bao nhiêu phát biểu sau đây về nghiên cứu này là đúng?

- I. Ở lô B, giai đoạn I có sinh khối thực vật lớn nhất và lượng khoáng thất thoát hàng năm là nhỏ nhất.
- II. Ở lô B, giai đoạn II có lượng khoáng thất thoát hàng năm tăng làm lượng khoáng trong đất giảm dần.
- III. Ở lô B, giai đoạn III xảy ra diễn thế nguyên sinh với sinh khối thực vật tăng dần.
- IV. Nghiên cứu này cho thấy phục hồi rừng có thể làm giảm sự thất thoát lượng khoáng trong đất.

A. 2.

B. 3.

C. 1.

D. 4.

HẾT